

FICHE NATURE

PIPISTRELLE COMMUNE



QUI EST-ELLE ?

La pipistrelle est une petite chauve-souris d'environ 4 cm de longueur et 20 cm d'envergure. Son pelage dorsal est brun sombre parfois brun roux, celui du ventre est un peu plus clair. La peau de sa face et de ses ailes est brun noir. La pipistrelle commune peut être confondue avec d'autres pipistrelles, comme la pipistrelle de Kuhl. Une clé de détermination est nécessaire pour une identification rigoureuse. Leurs cris d'écholocation enregistrés avec une "batbox" permettent également de les différencier. Ces cris, caractéristiques de chaque espèce, l'oreille humaine ne les perçoit pas. Son espérance de vie en milieu naturel est de 2 ans environ, mais elle peut vivre plus de 15 ans.

QUE MANGE-T-ELLE ?

Très opportuniste, elle chasse la nuit les insectes volants, préférentiellement des mouches et moustiques, mais aussi des papillons, cigales et éphémères. Si la chauve-souris utilise son cri d'écholocation pour s'orienter, elle l'utilise également pour chasser ses proies.

OÙ VIT-ELLE ?

Elle fréquente tous les types de milieux, même les zones fortement urbanisées. Le jour, pour s'abriter, elle s'adapte relativement bien à nos constructions. On peut la trouver dans des granges, garages, greniers, etc.

- En fonction de son cycle de vie, elle occupe trois types d'habitats: Pour la chasse, elle préfère les zones humides, les jardins et parcs, puis les milieux forestiers ou d'autres milieux ouverts. Elle est capable de s'alimenter à proximité des éclairages publics. Elle s'active de préférence dans le premier quart d'heure qui suit le coucher du soleil.
- Pour l'hibernation, de novembre à fin mars, mâles et femelles s'installent, en solitaire ou en groupe, dans des endroits confinés dans les bâtiments non chauffés tels que les greniers, les églises, mais aussi dans des murs fissurés, dans les tunnels ou dans les cavités de vieux arbres. Attention, tout réveil brutal d'une chauve-souris en hibernation peut lui être fatal !
- Pour les naissances, d'avril à mai, les femelles se regroupent en colonies de 30 individus à une centaine, dans les bâtiments, granges ou garages.

Les accouplements ont lieu à la fin de l'été, en août ou septembre. Ensuite, les pipistrelles se nourrissent au maximum pour préparer l'hibernation. Ce n'est qu'au printemps suivant que l'ovulation aura lieu pour assurer la naissance des petits à la meilleure période.

QUAND PUIS-JE LA VOIR ?

En fonction de son cycle de vie, la pipistrelle est plus au moins visible dans les milieux qu'elle fréquente. On ne peut l'apercevoir qu'après le coucher du soleil. S'équiper d'une "batbox" est souvent le meilleur moyen de la détecter.

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

Naissance

Accouplements

Hibernation

● visible

● peu ou pas visible